

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 6-1-77358560

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Rue St-Jean prolongée - B. P. n° 20 - 31130 BALMA - (Tél. 83-81-55 - 83-82-55)

ABONNEMENT ANNUEL 50 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 R TOULOUSE

- Bulletin technique N° 82 (26ème envoi de 1976) - 29 décembre 1976

ABONNEMENT - REABONNEMENT AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Avec ce bulletin du mois de décembre, l'abonnement aux Bulletins techniques de la Station d'Avertissements Agricoles s'achève pour l'année 1976.

Les tarifs restent inchangés pour l'année 1977 :

- Abonnement ordinaire 50 F.
- Abonnement collectif :
 - 1°/ à une même adresse . . . 50 F. + 30 F. par série supplémentaire de bulletins.
 - 2°/ à plusieurs adresses . . 50 F. + 40 F. par adresse supplémentaire.
 - 3°/ à plusieurs Stations
d'avertissements 50 F. + 40 F. par Station supplémentaire.

PAIEMENT : Exclusivement au Compte Chèque postal suivant :

SOUS-REGISSEUR RECETTES DIRECTION DEPARTEMENTALE AGRICULTURE HAUTE-GARONNE
B.P. N° 20 - 31130 BALMA. C.C.P. N° 8612-11 R. TOULOUSE.

Pour éviter les erreurs et les retards dans l'acheminement du bulletin qui en résultent, nous insistons auprès de nos abonnés pour qu'ils remplissent et nous adressent, en même temps que leur titre de paiement, la fiche de renseignements ci-après :

- NOM : _____ Prénoms : _____
- Nom de la rue : _____ N° _____
- Lieu dit : _____ Commune : _____
- Code postal : _____ Bureau distributeur : _____

Préciser, en les soulignant, vos principales cultures (1) :

- Vigne.
- Pommier - Poirier - Pêcher - Prunier - Noyer - Cerisier.
- Melon.
- Colza. - Céréales. - Maïs.

Vos cultures sont-elles à caractère commercial ou familial (1).

P.1.105

(1) Rayer les mentions inutiles.

Matières actives	m.a./ha,	stade	Stade	Observations
Spécialités	en g	culture	folle- avoine	
- Associations avec des antidicotylédones (suite) ;				
Isoproturon + dinoterbe (Tolkan A)	1.800 +1.500	Début tallage.	1 à 3 feuilles.	Ces produits sont actifs sur la plupart des graminées et dicotylédones annuelles; leur utilisation plus tardive (en raison notamment de la présence de M C P P) les rend cependant moins efficaces sur folle-avoine.
Isoproturon + mécoprop + + ioxynil (Fagal)	1.885 + 368 +1.067	-id-	-id-	
Méthabenzthiazuron + bromoxynil + mécoprop (Tricurnox triple)	1.800 + 290 + 910	-id-	Inactif.	

ATTENTION : Les produits à base de chlortoluron et de métoxuron ne sont pas utilisables sur certaines variétés de blé (voir notice du fabricant).

Les Ingénieurs chargés des
avertissements agricoles,
J. BESSON - E. JOLY - G. MELAC

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef
de la Circonscription phytosanitaire
"MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : P. JOURNET.

C.P.P.A.P. - N° 532 A.D.

P 106

- DESHERBAGE DU BLE D'HIVER EN POST-LEVÉE -

LUTTE CONTRE LES GRAMINEES

De nombreux agriculteurs n'ont pu effectuer de traitement de pré-levée en raison des conditions climatiques. En présence de graminées, les produits ci-dessous sont utilisables.

Nous rappelons que sur folle-avoine les traitements de post-levée précoce donnent les meilleurs résultats de rentabilité. Il est nécessaire, cependant, que ces traitements soient effectués sur des blés en bon état végétatif et en dehors de périodes de fortes gelées.

Matières actives	m.a/ha	Stade	Stade	Observations
Spécialités	en g	culture	folle-avoine	
<u>- Produits simples :</u>				
Chlortoluron (nombreuses spécialités)	2.400	1 à 2 feuilles à tal-lage.	3 feuilles maximum.	Actif sur toutes graminées annuelles ainsi que sur avoine à chapelets.
Métoxuron (Dosanex)	4.000	3 feuilles à fin tal-lage.	3 feuilles maximum.	Actif sur vulpin, pâturin, ray grass; irrégulier sur folle-avoine.
Méthabenzthiazuron (Tribunil)	1.750	3 feuilles à fin tal-lage.		Inactif sur folle-avoine mais bon antidicotylédones (sauf gaillet, véroniques).
Isoproturon (OFAL; I P 50)	1.800	1 à 2 feuilles à tal-lage.	3 feuilles maximum.	Actif sur toutes graminées annuelles.
Dichlobénil + monolinuron (Ciclanit)	1.200 + 450	Plein tal-lage.	Inactif.	Actif sur graminées annuelles et dicotylédones (sauf folle-avoine, gaillet, fumeterre et ray grass âgés).
Benzoyl prop éthyl (Suffix)	1.000	Redressement.	1 feuille à montaison.	Actif uniquement sur folle-avoine.
Flamprop méthyl (Suffix Qx)	1.500	Fin tal-lage.	1 feuille à montaison.	Idem que le précédent mais efficacité légèrement améliorée.
<u>- Associations avec des antidicotylédones :</u>				
Chlortoluron + mécoprop (Printan 22 L)	2.000 +2.000	Début tal-lage.	1 à 3 feuilles.	Ces produits sont actifs sur la plupart des graminées et dicotylédones annuelles leur utilisation plus tardive (en raison notamment de la présence de M C P P) les rend cependant moins efficaces sur folle-avoine.
Isoproturon + mécoprop (Printan K)	1.935 +2.185	-id-	-id-	

.../...